ETAPA 8


N
E
S
O
Sierra Tejeda
Arroyo del Alcázar
Arroyo de la Cueva de Don Pedro
Barranco de las Tejas Lisas
Canillas de Aceituno
Cueva de la Fajara
Río Bermuza
MA-4106
Ermita del Cristo
Alcaucín
Baños de las Majadas
Arroyo Puente de Piedra
Río Cárdenas
Los Cortijillos
MA-4104
El Cerro
Venta Baja
Río de Alcaucín
A-402
Barranco de Carcamo
El Puente
A-7205
Río Seco
El Toril
Río Seco (Los Migueles)
Pollo Pelao
A-7204
La Muela
Las Mayoralas
Embalse de Viñuela
Periana
Arroyo de Cantarranas
Las Casillas
Los Romanes
Los Castillejos
0
1
km

ETAPA 8
Canillas de Aceituno - Periana

LOCALIZACIÓN

La etapa da comienzo cerca del campo de fútbol de Canillas de Aceituno, donde nos adentramos muy pronto en un pinar. Después de pasar por Alcaucín y de recorrer **17 km** se llega a Periana, desde donde tendremos una vista muy completa de la comarca de la Axarquía.

Un tramo de la etapa transcurre, entre olivos, por el carril que se observa en la fotografía, antes de llegar a Periana. FOTO: ARM

¿SABÍAS QUÉ...



Sapo partero bético *(Alytes dickhilleni)*
FOTO: LGC

El sapo partero bético (*Alytes dickhilleni*, Artzen& García-Paris, 1995) fue descrito por primera vez para la ciencia a partir de ejemplares de Canillas de Aceituno, motivo por el que la localidad es conocida como su *terra tipica*. Este pequeño sapo debe su nombre a la costumbre de transportar los huevos sobre el cuerpo y es característico de las zonas montañosas, siendo la especie que alcanza mayor altura de todos los anfibios de Málaga. Se trata de un endemismo ibérico, esencialmente andaluz y sus poblaciones se encuentran dispersas en diversas montañas béticas de Andalucía oriental. En Málaga se encuentra únicamente en las sierras de Tejeda y Almijara. TEXTO: JSM

Mesa de Zalia, a la izqda y Boquete de Zafarraya. FOTO: ARM

DESCRIPCIÓN

SOBRE LA AVIFAUNA:

La etapa discurre entre la sierra, en su parte inicial, con formaciones de pino carrasco y cortados rocosos, y tierras de labor, dedicadas principalmente al olivo, la mayoría olivares jóvenes pero también con zonas en las que predominan ejemplares centenarios. También transcurre por zonas de erial donde domina la retama. De este modo, predominan las especies de zonas abiertas y de cultivo, con otras propiamente forestales.

ESPECIES SINGULARES

En Canillas podremos, al igual que en los pueblos de las etapas previas, observar especies habituadas a vivir cerca de la especie humana. Golondrina común, estornino negro y gorrión común son las especies más frecuentes en este inicio de etapa, que muy pronto se introduce en un pinar. Ya entre la vegetación arbórea podremos ver paloma torcaz, tórtola común, mirlo común, mosquitero común, papamoscas gris, carbonero común, carbonero garrapinos, herrerillo capuchino, agateador común y pinzón vulgar. En el entorno de la cueva de la Fájara, podrán aparecer roquero solitario y escribano montesino, y en el mismo cauce curruca capirotada y otras especies propias de ribera como chochín, petirrojo y oropéndola.

Antes de llegar a Alcaucín se pasa por zonas de erial y de cultivos de vid, donde aparecerá la cogujada común con tu típica cresta y sus alegres cantos, junto a tarabilla común, curruca cabecinegra, jilguero, pardillo común, verderón común y verdecillo.

A partir de Alcaucín comienza un descenso entre zonas de cultivo, principalmente

Golondrina dáurica. FOTO: JLM

olivos con algunos subtropicales, salpicadas de casas donde tórtola turca, estorninos y gorriones predominan, junto a golondrina común, petirrojo, colirrojo tizón, mosquitero común, curruca capirotada y jilguero.

Se cruza un arroyo antes de comenzar la subida que nos mostrará el pantano de la Viñuela, y desde este ya podremos disfrutar del boquete de Zafarraya y la mesa de Zalia, que jalonan grandes cortados en los que viven rapaces rupícolas que pueden verse desde el mismo recorrido de la etapa.

Una vez adentrados en tierras de olivar, con mosaicos de cultivos de cereal, de nuevo la cogujada común gana protagonismo. En el tramo que viene a continuación se podrán ver águila culebrera y calzada, que suelen usar la zona como zona de caza, águila perdicera, cernícalo vulgar, mochuelo, perdiz roja, vencejos común, pálido y real, paloma torcaz, tórtola común, lavandera blanca, bisbita común, zorzales común y charlo, curruca cabecinegra, alcaudones común y meridional, y varias especies de fringílidos.

El entorno de arroyo Seco es buen lugar para dedicar tiempo a la identificación de hirundínidos, ya que durante primavera y verano es posible observar hasta cuatro especies simultáneamente (golondrinas común y dáurica y aviones común y roquero). Además, la vegetación presente permite la presencia de curruca capirotada y zarcero común, junto a otras especies mencionadas anteriormente.

Jilguero. FOTO: JLM

Antes de llegar a Periana cabe destacar la presencia de olivos de gran envergadura, donde además de carboneros comunes y pinzones, podremos observar al escaso alzacola, aunque se trata de una especie difícil de ver.

Pinzón vulgar macho. FOTO: JLM

FENOLOGÍA

Del mismo modo que las etapas previas, las diferencias estacionales en las especies que pueden observarse no son muy acusadas, de modo que es una etapa recomendable durante todo el año, evitando los periodos más calurosos. ○