






ETAPA 19

Campillos - Embalses del Guadalhorce

LOCALIZACIÓN

Etapa que comienza en Campillos, donde la calle del doctor Óscar Fernández nos sirve de punto de salida. En este recorrido descubriremos lagunas que nos recordarán a verdaderos oasis entre zonas de cultivo. Finaliza, tras **23 km**, en la cabecera de los Embalses de Guadalhorce y Guadalteba, en la zona donde coinciden los diques.

DESCRIPCIÓN

SOBRE LA AVIFAUNA:

Con esta acaba una serie de etapas en las que los medios agrícolas han sido predominantes, para dar paso a zonas más serranas. Continúan siendo frecuentes los olivares y zonas de cereal, aunque



Grupo de cuervos. FOTO: JLM

presenta la particularidad de visitar zonas húmedas del complejo de lagunas de Campillos, y de cruzar formaciones de pinar, lo que convierte el recorrido en un mosaico paisajístico acompañado de una interesante variedad de aves.

ESPECIES SINGULARES

En el núcleo urbano de Campillos tendremos ocasión de observar especies urbanas, principalmente tórtola turca, vencejos común y pálido, golondrina común, avión común, estornino negro

¿SABÍAS QUÉ...

En el Catálogo de los Lagos de España, elaborado por el hidrobiólogo Luis Pardo, en 1948, señala las lagunas endorreicas esteparias de Campillos como un conjunto relacionado, al suroeste de la laguna de Fuente de Piedra, citando las lagunas Dulce, del Cerero, Salada, de Camuñas, de Capacete, de Lobón, Redonda y de la Marcela. Por Ley de Espacios Naturales de 1989 del Parlamento Andaluz las cinco primeras quedarían protegidas como Reservas Naturales. Se observan aves acuáticas como flamenco, cigüeñuela, pato cuchara, ánade silbón, focha común, malvasía, diversas especies de gaviotas, así como un importante contingente de grulla común invernante. TEXTO: SMB



Ejemplar macho de sísón. FOTO: JLM

y gorrión común, a las que se sumarán cernícalo vulgar y estornino pinto en las naves industriales que encontramos a la salida. Una vez las dejamos atrás, entramos en olivares y cultivos donde serán la perdiz roja, tórtola común, abubilla, cogujada común, zorzal común, mirlo común, petirrojo, curruca capirotada, mosquitero común, carbonero común, jilguero, pardillo y triguero, las especies más frecuentes. Aunque se indica al sísón como especie representativa de la etapa, y de hecho puede observarse en su trazado, un lugar muy adecuado para disfrutar de esta especie es el entorno de la laguna Dulce, muy cerca del punto de inicio.

La presencia de encinas de gran porte, salpicadas, evidencian lo que debieron ser estas tierras antes de ser roturadas para ser dedicadas al cultivo.

Éstas facilitan la presencia de especies como el ratonero común, carbonero común y cuervo.

Las lagunas que se visitan son, por orden de aparición en la etapa, la del Cerero, de Camuñas y la Marcela, zonas que suponen verdaderos oasis para las especies acuáticas en un entorno dominado por secas tierras de labor. Las especies más frecuentes en estos humedales son zampullines chico y cuellinegro, somormujo lavanco, garza real, flamenco, ánades real y friso, patos cuchara y colorado, porrón común, malvasía, polla de agua, focha común, cigüeñuela, avefría, chorlito dorado, agachadiza, andarríos grande y chico, gaviota reidora, lavanderas blanca y boyera y bisbita común. Además, pueden observarse grullas en su entorno durante los meses de invierno.



La etapa cruza cultivos herbáceos, en mosaico con olivares. FOTO: ARIM



Codorniz. FOTO: JLM



Triguero. FOTO: JLM

En el pinar que encontramos antes de cruzar el arroyo del Boquerón podrían aparecer paloma torcaz, tórtola común, abubilla, verderón común, verdecillo, piquituerto y pinzón vulgar, mientras que en las zonas de matorral a cruzar antes de descender a los embalses serán cogujada común, tarabilla, petirrojo, zorzal común y curruca cabecinegra las aves más fáciles de observar.

Durante las épocas de migración esta parte de la etapa suele ser sobrevolada por milano negro, abejeros y numerosos

abejarucos, y tampoco es raro disfrutar del vuelo de buitre leonado, águila perdicera y halcón peregrino, que frecuentan la zona en busca de alimento.

Ya en el final de la etapa, a pie de embalses, otra vez las aves acuáticas adquieren protagonismo, aunque la profundidad de las aguas limita la diversidad de especies, principalmente gaviotas sombría, patiamarilla y reidora, ánadea real, zampullines chico y cuellinegro, somormujo lavanco, cormorán grande, garza real y focha común.



Garza real. FOTO: JLM

FENOLOGÍA

Los meses de invierno son muy apropiados para realizar la etapa, ya que permitirán disfrutar de las numerosas aves acuáticas invernantes que ocupan las zonas húmedas que se visitan, aunque la primavera es también muy buen momento por la diversidad de especies reproductoras. Se recomienda evitar los periodos más calurosos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aunque la etapa no pasa por la laguna de Capacete, se recomienda su visita por ser un lugar de presencia habitual de malvasía cabeciblanca. Se trata de una laguna cuya profundidad media está en torno al metro y cuyas aguas son ligeramente saladas. La vegetación que la rodea está compuesta principalmente por tarajes y carrizos, donde es posible oír y ver

Gorrión moruno. FOTO: JLM





al zarcero bereber y nidifican los carriceros común y tordal. Aunque durante mucho tiempo fue usada como zona receptora de los purines de la cercana granja de cerdos, desde que se prohibió dicha actividad la calidad de sus aguas mejoró de forma notable. Al igual que las otras lagunas visitadas en el transcurso de la etapa se incluye en la Reserva Natural Lagunas de Campillos. ●



Gorrión común. FOTO: JLM



Zarcero pálido. FOTO: JLM



Cogujada común. FOTO: JLM



Estornino pinto. FOTO: JLM